

Cárie dentária:

Magnitude do problema no Brasil

Dados sobre a evolução da doença cárie no Brasil e um panorama sobre a situação em diferentes faixas etárias.

INDICADORES

Entenda a nomenclatura utilizada para medir o índice da doença cárie na população.

Dentição decídua



ceo-d

Sigla utilizada para medir o índice em crianças de 5 anos.

Dentição permanente



CPO-D

Em crianças de 12 anos, adolescentes de 15-19 anos, adultos de 35 a 44 e idosos de 65 a 74 anos.

META da OMS

Para crianças de **12 anos**, o índice ideal definido pela OMS deve ser

<1

SIGLAS:

C/c = Cariado e = Extraído
P= Perdido D/d = Unidade
O/o = Obturado Dente

Como calcular?

O cálculo do índice CPO-D é simples. Basta indicar a quantidade de dentes com as características C, P e O, depois somar os valores e dividir pelo número de pessoas analisadas.


NO BRASIL

Evolução do índice CPO-D em **crianças de 12 anos** entre os anos 1993 e 2010.

CPO-D NO BRASIL

De acordo com pesquisa Nacional feita em 2010, o índice CPO-D médio em crianças de 12 anos, é de

2,07.




Apesar de estar acima da meta da OMS, houve uma melhora no índice, como mostra o gráfico.



Entre 2003 e 2010 a proporção de crianças livres de cárie (**CPO-D = 0**) aumentou de **33% para 44%**.

Mas os adolescentes **ainda tem muita cárie...**



... e continuamos a **perder dentes entre a população mais idosa!**

Em idosos acima de 65 anos, o **CPO-D médio é de 27,53**. Esse é um **dado alarmante** pois significa que quase todos os dentes foram **acometidos pela doença cárie**.

98,3%

dos idosos possuem dentes perdidos.



CPO-D POR REGIÃO (2010)

NORTE, NORDESTE e CENTRO-OESTE tem CPO-D acima da média nacional, enquanto SUL e SUDESTE estão abaixo.

CONCLUSÃO

De acordo com levantamentos nacionais, a realidade epidemiológica mostra que:

- O Brasil segue a mesma **tendência mundial de declínio** de cárie na população, embora tenha demorado mais para atingir níveis CPO-D menores.
- O **adolescente** é uma faixa etária que precisa ser priorizada nas ações de saúde bucal.
- Há uma persistência de **altos níveis de edentulismo** em população adulta e idosa.
- A **cárie é uma doença socialmente determinada**, ou seja, ela é mais frequente nos grupos mais vulneráveis, o que os cientistas chamam de "polarização da doença cárie".

Dúvidas?

Entre em contato pelo e-mail: eviporalhealth@usp.br ou através do site www.observatorio.laoha.com.br

